

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-3-6-30686803
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 60 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 173 du 9 JUIN 1980

VIGNE

MILDIOU

Quelques foyers ont été signalés au cours de la semaine passée. Ils correspondent aux pluies de la dernière décade de Mai, et en particulier aux orages des 27 et 28, localement abondants en Charente-Maritime. Il est à remarquer qu'un des foyers (St Sauvant-17) était dû à un épandage de marcs sur le sol : les plantules ont été contaminées dès leur levée et le repiquage a amené des contaminations relativement graves sur la vigne.

Le traitement conseillé le 29 Mai assure une protection suffisante sauf si des précipitations importantes survenaient dans les prochains jours.

VERS DE LA GRAPPE

Les pontes déposées ont été assez peu nombreuses en général. Ne traiter qu'en présence d'attaques.

CEREALES

MALADIES DU FEUILLAGE ET DES EPIS

Seule la rouille jaune peut justifier des traitements tardifs sur parcelles fortement attaquées. Se reporter à nos bulletins précédents.

CECIDOMYIES

Les vols, abondants jusqu'au 7 Juin, ont fortement diminué depuis, mais ils peuvent reprendre à la faveur d'une période chaude surtout si des pluies viennent apporter un peu d'humidité à la surface du sol. Se reporter à nos bulletins précédents pour les traitements éventuels en zones tardives.

PUCERONS

Les traitements réalisés après la floraison sont sans intérêt sur des infestations relativement faibles comme c'est le cas en général cette année.

TOURNESOL

PUCERONS

On observe actuellement des infestations de pucerons sur cette culture. Ceux-ci sont localisés dans le coeur des plantes, et leur couleur (jaune-vert) les rend particulièrement difficiles à voir. En cas d'infestations importantes, comme c'est le cas dans le Châtelleraudais, il est conseillé d'intervenir, car il est possible que ces attaques aient des conséquences sur le développement des plantes. Compte tenu de la localisation des pucerons, il est préférable d'utiliser un produit à forte action de vapeur comme le pirimicarbe (Pirimor) à la dose de 250 g de produit commercial/ha; majorer les doses si les cultures couvrent peu le sol, ou si le temps est froid.

P.14.08

PUCERONS

Les infestations de pucerons cendrés sont inquiétantes dans certaines parcelles. Les traitements seront en général inutiles, sauf en zones tardives lorsque les colonies sont très nombreuses.

ARBRES FRUITIERSCARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES

Dans les zones de précocité moyenne, le premier traitement doit être fait dès réception. Dans les secteurs les plus tardifs de la région (Gâtines) intervenir au début de la semaine prochaine.

Le premier traitement qui avait été conseillé au début du mois dans les zones les plus chaudes n'assure plus une couverture suffisante en raison de la croissance des fruits : un renouvellement est conseillé en fin de semaine pour coïncider avec les éclosions des pontes déposées entre le 3 et le 6 Juin.

CULTURES LEGUMIERESTEIGNE DU POIREAU

Les indications de notre précédent bulletin restent valables. Un premier traitement des poireaux-légumes pourrait être fait dans le courant de la semaine en secteurs très précoces. Attendre un prochain bulletin pour les zones plus tardives.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 9 Juin 1980 - Précédente Note : Bulletin n° 172
du 3.6.80

N° Papier de Presse : 535 AD.